Для того чтобы ваш матрас прослужил максимально долго, внимательно прочитайте инструкцию и следуйте её рекомендациям:

Во избежание деформации, матрас при транспортировке и хранении должен находиться в горизонтальном положении на ровной поверхности.

Во избежание образования провалов не выкладывайте матрас на пружинные (панцирные) сетки и мягкую поверхность.

Матрас необходимо переворачивать раз в 3 месяца (по горизонтали «голова — ноги» и вертикали «верхняя сторона — нижняя сторона»).

Ограждайте матрас от попадания на него жидкостей.

Запрещается прыгать и ходить по матрасу (в том числе и детям). Пружинные матрасы не допускается оставлять в вертикальном положении.

Для чехлов матрасов и наматрасников допускается только сухая чистка.

Подбирайте матрас не пренебрегая рекомендованной производителем нагрузкой на спальное место.

Для продления срока эксплуатации — используйте защитный наматрасник.

Запрещено размещать матрасы рядом с открытыми участками огня и огнеопасными приборами.

Герметичная упаковка матраса сохраняет запах нового изделия, поэтому перед использованием, матрас рекомендуется проветривать в просторном помещение, дабы удалить производственный запах.

Защитный наматрасник необходимо стирать при температуре не более 30° С в режиме деликатной стирки без агрессивных моющих средств и отбеливателей.

Матрасы и топперы с кокосовой койрой запрещается использовать на неровной поверхности (продавленных матрасах и диванах).

Запрещается эксплуатация матраса, если его габаритные размеры превышают размер кроватей.

Наилучшей основой для матраса служит сплошная, ровная, жёсткая поверхность или ортопедическое основание с упругими ламелями, расстояние между которыми не более 5 см.

Даже самый хороший матрас со временем становится менее удобным, поэтому рекомендуем менять матрас каждые 8–10 лет.

Новый матрас может показаться более жёстким или мягким относительно образцов в наших салонах. Не торопитесь с выводами, так как период привыкания к новым ощущениям и обминанию настилочных материалов под индивидуальные особенности типа человека не менее 60 дней.